

Balkon eper (Fragaria)

Balkon eper nevelésére magról szaporított, indákat nevelő, erős lombú, mutatós virágú, formás és ízletes gyümölcsseit a fagyokig folyamatosan hozó fajták alkalmasak. Cserépben vagy függőkosárban neveljük, a készáru dézsába és balkonládába is kiültethető.

A nappalhossz hatása

A Fragoo fajták a nappalok hosszára közömbös, a virágzáshoz nem szükséges rövidnappalos hatás. A mesterséges megvilágításnak nincsen negatív hatása a növények virág és termésképzésére.

Közeg

Használjunk rostos szerkezetű, levegős, jó vízgazdálkodású, kb. 15 % agyagot tartalmazó, 5,9-6-os pH értékű termeszítő közeget.

Tápanyagellátás

A vegetatív növekedés időszakában 1,5:1:1,5 NPK arányú, mikroelemeket is tartalmazó komplex műtrágyával tápoldozzunk. A virágzás és gyümölcserlelés időszakában káliumtúlsúlyos műtrágyát adjunk. Ajánlatos az ámpolnacserép talajába hosszú hatástartamú, káliumtúlsúlyos műtrágyát keverni.

Termesztés

12-es cserépbe egy palántát, vagy 30 cm-es ámpolnacserépbe 3 növényt ültessünk.

A Fragaria növekedésének minimum hőmérséklete 7°C. A beültetés után kb. 2 hétig tartunk 16-18°C-ot, a vegetatív növekedés időszakában (4-6 hét) 14-16, míg virág és termésképzéskor 12-14°C-ot.

A virágzás kezdetétől számítva 4-5 hét múlva számíthatunk az első gyümölcs megjelenésére. A kultúra hossza 63-as szivarpalántáról indítva korai termesztésben 12 hét, nyáron 10 hét. A megfelelő termésképzés érdekében tartunk a növényeket nedvesen, sohasse engedjük kiszáradni a közeget, rendszeresen tápoldatozzuk. Termesszük napos helyen, árnyékolás nem szükséges.

Termésképzés

A virág és termésképzés érdekében már a termesztés elejétől fogva szedjük le az indákat. Az önbeporzás és a szélbeporzás elegendő a terméképzéshez. Ajánlatos a ház olyan részén tartani, ahol jól mozog a levegő. A virágzástól a termésérésig korai termesztés esetén 4-5, míg nyáron 3-4 hét szükséges.

Növényvédelem

A virágok megjelenéséig a szokásos, szamóca-termesztésben is használható szerekkel védekezhetünk. A termő állományt csak szükség esetén kezeljük, ekkor azonban szigorúan tartunk be az ételmezés-egészségügyi várakozási időket. Kék és sárga fogólapokkal jól nyomon követhetjük a kártevők esetleges megjelenés