

## Bidens

### Felhasználás

Fényes sárga virágú, igen erőteljesen bokrosodó, lazán lecsüngő növény, amely a balkonládák, függőkosarak sárga színű slágernövénye. Gyakran kombinálják futómuskátlival. Virágai 2-2,5 cm-esek, a nyár folyamán napos vagy félárnyékos helyen folyamatosan és bőven nyílnak. Erőteljes növekedése miatt hasonlóan erős fajokkal ültessük össze, különben a többit elnyomhatja. Jól tűri a napos fekvést.

### Termesztés

Több növény 25 cm-es függőkosárban minimum kétszeri visszavágással történő termesztéséhez január végén, február elején ültessünk. 10-11 cm-es cserépben történő termesztéshez február végén, március elején cserepezzünk.

Gyökeresedés alatt két hétig biztosítsunk 18°C-ot, később 12-15°C-ot. A növekedés megindulása után vágjuk vissza, ezt később legalább egyszer ismételjük meg. A növény az utolsó visszavágás után kb. 6-8 héttel virágzik.

Kompakt növekedést érhetünk el tehát a visszavágással, illetve az alacsony hőmérséklettel (12°C), valamint 2-3 alkalommal alkalmazott 0,3%-os Alar vagy 0,5%-os Cycocel kezeléssel.

Használjunk agyagtartalmú, pH 6 értékű közeget. A Bidens nagy tápanyagigényű növény. Biztosítsunk világos helyet. Hidegkultúras termesztés esetén a cserepezést októberben, novemberben végezzük.

A meggyökeresedésig tartssunk 12-15°C-ot, majd 10-12°C-ot. Kb. 6 hétig 5-8°C-on tartva megfelelő nagyság érhető el. Ebben a szakaszban 1-2 alkalommal visszacsíphetjük a növényt. Február közepétől a hőmérsékletet emeljük 8-12°C-ra, mert a hideg a virágzást késlelteti. Sűrű térállás esetén fennáll az összenövés veszélye.