

Cineraria (Pericallis) – cserepes

Venezia F1 hibrid sorozat

Az alábbiakban a Venezia F1 hibrid fajtásorozat termesztéstechnológiáját közöljük, amely különlegessége, hogy a virágképződéshez nem igényel hideghatást, így majdnem az egész évben jól programozhatóan tervezhető, azaz ősszel, télen és tavasszal egyaránt virágoztatható.

Vetés

Magmennyiség: kb. 4000 mag/g.
1000 növény előállításához kb. 0,5 g magra van szükség.

A vetést augusztus elejétől kezdjük és szeptember végéig folytathatjuk. Ekkor a virágzás decembertől március elejéig várható. Az optimális csírázási hőmérséklet 18°C. A csírázáshoz kb. 8-10 napra van szükség. A vetést vékonyan takarhatjuk.

Szakaszos virágoztatás lehetséges: júliusi vetésből december végén, január elején virágzik, augusztusi vetésből januárban, szeptemberi vetésből februárban.

Termesztés

A kb. 4 hetes palántákat tűzdeljük, majd további 4 hét múlva cserepezzük. Használjunk 10-12 cm-es cserepet.

A termesztés során a hőmérséklet legyen 12-14°C. A viszonylag alacsony hőmérséklet, illetve a száraz tartás elősegíti a bimbóképződést. Biztosítsunk hűvös és szellős körülményeket. A teletetés 5-8°C-on történhet kb. 4 héten keresztül. A virágoztatáshoz 12-14°C-ot biztosítsunk.

A kultúra időtartama

Kb. 5-6 hónap a vetésidőtől és a hőmérséklettől függően.