

Díszkáposzta (Brassica)

Vetés

Magmennyiség: 300 mag/1 g.
1000 növény előállításához kb. 6 g magra van szükség.

A vetést májustól júliusig folyamatosan végezhetjük. Így a díszkáposzták a kiültetésekben az egynyáriakat követik szeptember végétől. (Korábbi vetés nem lehetséges, mert tavaszi vetés és nyári kiültetés esetén a díszkáposzta magszárra megy.) Az optimális csírázási hőmérséklet kb. 15°C. A csírázáshoz kb. 6-8 nap szükséges.

Termesztés

A vetés után kb. 4 héttel közvetlenül a 12-14 cm-es cserépbe tűzdelhetjük a palántákat. A talaj pH értéke 6,5-7 körüli legyen. A nevelés során az optimális hőmérséklet 10-12°C, tehát próbáljunk minél hűvösebb, levegős helyet biztosítani a növényeknek, nehogy megnyúljanak, és hogy kialakulhasson a fajtára jellemző szín. Növekedésszabályozásra nincs szükség.

Színeződés

Ügyeljünk arra, hogy a növényeket ne hagyjuk túltrágyázzuk, mert akkor a levelek színe nem alakul ki. A megfelelő színeződést az alacsony hőmérséklet segíti elő, ezért lehetőleg 10°C alatti hőmérsékletet kell biztosítani. Ezért is tanácsos a viszonylag kései vetés, hogy az őszi hűvösebb időjárás segítségünkre lehessen.