

Fuchsia

Felhasználás

Elsősorban függőkосarak, balkonládák kiváló növénye, de ültethető ágyásba, és nevelhető törzses fácska is belőle.

Termesztés

Használjunk 10-12 cm-es cserepet. Az ültetést januártól márciusig végezzük. A cserepezés után tartsunk 20°C-ot, a meggyökeresedés után pedig 16-18°C-ot. 3-4 levélpárnál a jó bokrosodás érdekében csípjük vissza. Ezt cserepezés után még néhányszor megismételhetjük.

Biztosítsunk jól levegőző, agyagtartalmú, 5,5-6,5 pH értékű talajt. Cserepezés után és különösen a téli hónapokban a fukszia palánták sóérzékenyek, ezért a növekedési szakaszban ne tápoldatozzunk, a téli hónapokban pedig óvatosan, kis töménységű tápoldattal kezeljük. A meggyökeresedés után közepes tápanyagtartalmú közeget készítsünk. A következőkben 1:0,8:1 tápanyag-összetételű, később foszfor és kálium túlsúlyos tápoldatot használjunk. Ezt a tápoldatot minden öntözéssel vagy legalább hetente egyszer 0,05-0,1%-os oldatban juttassuk ki. Gondoskodjunk jó szellőzésről.

A fukszia hosszúnappalos növény, tehát ilyen viszonyok között gyorsabban virágzik. Kb. 7-10 hét hosszúnappalos hatásra van szüksége. Mivel nálunk a hosszúnappalos hatás március 20 körül kezdődik, így a fukszia természetes viszonyok között is virágzik és valójában pótmegvilágításra nincs szüksége.

Ennek ellenére plusz egy hét pótmegvilágítás hatásos lehet. A januárban, februárban és márciusban biztosított pótmegvilágítással (a nappalhosszúság megnyújtásával) a természetes virágzási idő korábbra hozható. A pótmegvilágítás erőssége minimum 100 lux/m² legyen (izzólámpából minimum 25 watt/m², azaz egy 100 wattos égő/3 m²). A megvilágítás hossza januárban 5 óra, februárban 4 óra, márciusban 2-3 óra, a világítás kezdete 22 órától. Mielőtt megkezdjük a kiegészítő megvilágítást, végezzük el a visszavágást. A visszavágás után 2-3 cm-es hajtás maradjon. A pótmegvilágítás ideje alatt a hőmérséklet ne csökkenjen 16°C alá. A pótmegvilágítás minden esetben kb. 10 héttel előzze meg a kívánt virágzási időt. A természetes virágzási idő május eleje, közepe. Az egyes fajták különbözőképpen reagálhatnak a naphossz megváltoztatására: az egyszerű virágú fajták például általában korábban virágznak. Ezeknek a fajtáknak csak 8 hétre, míg a teltvirágúaknak kb. 10 hétre van szükségük a virágzásig.

A növekedés szabályozásához az alábbiakra kell figyelniük. Fontos, hogy a növényeket helyes időben csípjük vissza. Biztosítsunk világos és szellős helyet a növényházban, ami szintén a kompakt növényforma kialakulását segíti elő. Kémiai növekedésszabályozás is lehetséges, ha a becserepezett növényen a hajtások 2-3 cm hosszúak. A gyenge növekedésű fajtákat óvatosan kezeljük. Használható a Cycocel 0,3-0,5%-os oldata permetlé formájában vagy 1%-os oldatban beöntözéshez. Előfordulhat, hogy a levél kivilágosodik. Kezeléskor a növény száraz, a talaj pedig nedves legyen. Az Alar 0,3-0,6%-os oldata is használható.