

Petunia

A Petunia grandiflora, multiflora és milliflora termesztése alapvetően megegyezik, ezért csak a Petunia pendula nevelésére vonatkozó eltéréseket ismertetjük külön.

Vetés és csírázás

Magmennyiség: kb. 7.000 - 14.000 mag/g. 1000 növény előállításához kb. 1/4 g magra van szükség.

Az optimális csírázási hőmérséklet 20-21 °C. A csírázás ideje 10-12 nap. Vetéshez laza talajkeveréket használjunk, nagyon vékonyan vagy egyáltalán ne takarjuk a megvetést. Védekezzünk a palántadőlés ellen.

Átültetés és cserepezés

Vetés után kb. 4 héttel a palántákat ládába, vagy ha elég helyünk van, közvetlenül a végleges cserépbe, ill. az ún. pack-ekbe tűzdelhetjük. A végcserép legalább 7x7 cm-es kocka, de inkább 9 cm-es körcserép legyen. A cserepezéshez a szokásos, egynyáriaknak megfelelő földkeveréket használjunk, amely laza, jó vízáteresztő, pH értéke kb. 5,5-6,5.

Hőmérséklet

18-20°C-ot kell mindaddig tartanunk, amíg az átültetést követően a gyökérfejlődés újra meg nem indul. Később, az éjszakai hőmérséklet fokozatosan csökkenthető 12-15°C-ra, a nappali 16-17°C-ra.

Ápolás

A kultúra kezdetén a talajt megfelelően nedvesen kell tartanunk. Azonban különösen a szállítás előtti hetekben legyen a talaj szárazabb, így elkerülhetjük a növények megnyúlását és elősegítjük a bimbók képződését. 10-14 naponta használjunk

összetett műtrágyát a tápanyagok megfelelő szinten tartása érdekében. A cserepeket, ill. pack-eket rendszeresen mozgassuk a legyökeresedés megelőzése érdekében.

Növekedésszabályozás

Kompakt növények eléréséhez sikeresen használható az Alar, ill. a B9 növekedésszabályozó. A kezelést akkor kell elkezdni, amint az első oldalhajtások megjelennek (0,5 cm-es nagyság). A kezeléseket célszerű 1-2 alkalommal, 0,3 %-os dózisban 7-14 napos időközönként megismételni. Csak fiziológiailag aktív növényt kezeljünk, amikor a talaj nedves, de a levélzet száraz. Amint az első bimbók megjelennek, hagyjuk abba a kezelést, különben késhet a virágzás. Később a túlzott növekedést a növény szárazon tartásával akadályozhatjuk meg.

A kultúra időtartama

A kultúra időtartama 10-12 hét között változik, a termesztési módtól és a kívánt növénymérettől függően.

PETUNIA PENDULA – futó petúnia

Termesztése a törpe petúniáktól kissé eltér: fokozottabban kell figyelni a nyúlás megelőzésére, illetve figyelni kell a termékleírásban szereplő tenyészidőre és szükség esetén 1-2 héttel korábban kell vetni/ültetni. A 4-5 hetes magoncot vagy a tálcás szivarpalántát tűzdeljük közvetlenül min. 11-12 cm-es cserépbe. Így biztosíthatjuk a kellő térállást, ami a kompakt növekedéshez feltétlenül szükséges. Szintén nagyban elősegíti a kompakt habitus kialakulását és a jó bokrosodást, ha egyszer visszavágjuk a növényeket. Ekkor kb. 20 cm magas, virágokkal bőven borított, mutatós cserepes árut kapunk. Alarral a szokásos módon kezelhetjük.