

Torenia

Érdekes virágú, kompakt növekedésű, különleges nyári cserepes növény. Tavaszi és nyári termesztésre egyaránt alkalmas, akár nagyobb cserépben, függőkosárban történő termesztésre is.

Vetés

A vetést általában február végétől kezdjük. A csírázás optimális hőmérséklete 18-20°C. A csírázás kb. 10-14 napot vesz igénybe. Későbbi vetés esetén vethetünk közvetlenül a 10-11 cm-es végcserépbe is 1-3 magot.

Termesztés

A vetés után 2-3 héttel tűzdelhetjük a magoncokat, általában 2-3 növényt a 10-11 cm-es cserépbe. Függőkosárba 3-5 növényt ültessünk 4-6 héttel a vetés után.

A termesztés során biztosítsunk 15-18°C hőmérsékletet, világos és szellős körülményeket. A Torenia közepesen tápanyagigényes.

Szükség esetén visszacsíphetjük, illetve növekedésszabályozóval kezelhetjük (0,2%-os Alar vagy Cycocel) 2-3 alkalommal, bár a korszerű, alacsony fajták esetén erre nincs feltétlenül szükség. Nagy növény neveléséhez érdemes visszavágni, ami után az új virágzás kb. 4 héttel várható.

A kultúra időtartama

Növényházban a vetéstől számítva 8-10 hét, későbbi ültetés esetén 6-8 hét. Az április végén ültetett félkész palánta