

## Bellis

### Vetés

Magmennyiség: 5700 mag/g.  
1000 növény előállításához kb. 0,5 g magra van szükség.

A vetést szabadföldön június végén - július elején, növényházban pedig augusztusban végezzük. A virágzás áprilisban várható.

Az optimális csírázási hőmérséklet 18 °C. A csírázáshoz kb. 7-14 nap szükséges. A magvetést csak nagyon vékonyan takarjuk.

### Termesztés

A termesztés során 12-16 °C-ot biztosítsunk. Szabadföldi termesztésben a növényeket 20 x 20 cm-re ültethetjük ki, cserepes termesztésben pedig 9 cm-es cserépbe tűzdeljük.

Szükség esetén növekedésszabályozóval (Alar) kezelhető.

Mind őszi, mind tavaszi termesztés esetén 10-11 cm-es cserépbe egy palántát, 12 cm-es cserépbe 2-3 palántát ültessünk. Szükség esetén vissza lehet csípni a növényeket, de ez késlelteti a virágzást. Kora tavaszi virágzáshoz tartsuk az állományt fagymentesen vagy hajtassuk, így már március végén-április elején megkezdődik a virágzás.

### Őszi virágoztatás

Egyes fajták már ősszel, hideghatás nélkül virágoztathatóak (Speedstar, Galaxy). A termesztés során az árvácskához hasonló technológiát alkalmazzunk.