

Limonium sinuatum

Vágott virágnak alkalmas fajták

Vetés

A vetést februártól kezdjük növényházban. Az optimális csírázási hőmérséklet 16°C. A csírázáshoz kb. 7-14 napszükséges.

Magmennyiség: kb. 300 szem/g.
1000 növény előállításához kb. 5 g magra van szükség.

Termesztés

A hőmérséklet a továbbiakban 13-15°C legyen. Cserepes nevelés esetén 8-9 cm-es cserepet használjunk.

A jó bimbóképzéshez kb. 4 héten át 10°C-ot, vagy 5 héten át 12°C-ot tartsunk a ültetés előtt vagy után. A szabadföldi kiültetést az áprilisi edzés után májusban, júniusban végezhetjük. A kiültetési sor- és tőtáv kb. 30 x 30 cm.

A kultúra időtartama

Kb. 5 hónap. Egynyári kiültetéshez kb. 3 hónap alatt kapunk kész palántát.

Egynyári termesztésre alkalmas fajták

Egyes Limonium fajtákból nyári cserepes is nevelhető.

Alacsony, kb. 25 cm magas, kerek bokrot alkot, a virágszárak rövidek, erősek. Vágott virág előállítására ezek a fajták nem alkalmasak.

Vetés

Akár már októbertől folyamatosan vethető, ültethető, általában az egynyáriakkal megegyezően időzítjük.

Termesztés

Akár már októbertől folyamatosan vethető, ültethető. Használjunk 10-12 cm-es cserepet. A keléshez 15°C-ot, később 5-10°C-ot biztosítsunk. Téli termesztése 7°C fölött lehetséges.

A kultúra időtartama

A kultúra hossza kb. 4 hónap.