

Lobelia erinus

Fajták

Lobelia erinus compacta - törpe lobélia
Magassága kb. 10 cm.

Lobelia pendula - csüngő lobélia
Balkonládák, függőkosarak önálló vagy vegyes beültetésére.

A két típust hasonló módon termesztjük.

Vetés

Magméret: kb. 30.000 mag/g. 1000 növény előállításához kb. 0,5 g szükséges.

A vetést januártól márciusig végezzük. A csírázáshoz biztosítsunk 18°C-ot. A csírázás kb. 7-14 napot vesz igénybe. Vethetünk ládába vagy több magot szórva közvetlenül cserépbe. A vetést ne takarjuk.

A lobéliából pillírozott (drazsírozott) vetőmagot is kínálunk. Ezzel a vetésmóddal ládában sorba vagy szivartálcába vetve a tűzdelés megtakarítható. Egy-egy drazséből 3-8 növény fejlődik, így a fejlődő palánta egyenértékű a csokrosan tűzdelt palántával. Az így kikelt csokrok károsodás nélkül cserepezhetőek. A drazsét fungiciddal kezelik a palántakori betegségek ellen. Fokozottan ügyeljünk arra, hogy a vetőközeg mindig nedves legyen.

Termesztés

Ha ládába vetettünk, a palántákat 4-6 hét elteltével tűzdelhetjük a 9 cm-es végcserépbe, lehetőleg 3-5 növényt egy csokorba szedve. Esetleg egyesével is tűzdelhetünk. A pillírozott vetőmagból eleve csokros palántát kapunk, ez ne szedjük szét, egy csokrot ültessünk egy cserépbe.

A hőmérséklet a tűzdelés után kb. 18°C, később 12-15°C legyen.

A törpe növekedésű fajták neveléséhez növekedésszabályozókra általában nincs szükség.

A kultúra időtartama

A kultúra hossza kb. 10-11 hét.